

別表 セグロウリミバエ防除に用いる農薬

R7.6.2時点

現在、農作物におけるセグロウリミバエの防除に使用可能な登録薬剤はないが、植物防疫法第29条第1項に基づく措置として、発生ほ場では農薬の登録内容を遵守し、以下の農薬による防除を行うことが可能。

【ウリ科野菜】

きゅうり

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	4回以内	4回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
テルスターフロアブル	ピフェントリン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マブリック水和剤20	フルバリネート水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	5回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内)

きゅうり(施設栽培)

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温燻蒸は合計3回以内)

すいか

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)	散布	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
エルサン乳剤	PAP乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
ハチハチフロアブル	トルフェンピラド水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
マブリック水和剤20	フルバリネート水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	6回以内	6回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	6回以内	6回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)

かぼちゃ

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで (ただし、露地栽培については着果後)	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
エルサン乳剤	P A P 乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
マブリック水和剤 2 0	フルバリネート水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
マラソン粉剤 3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)

メロン

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	150～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
エルサン乳剤	P A P 乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	4回以内	4回以内
オリオン水和剤 4 0	アラニカルブ水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
マブリック水和剤 2 0	フルバリネート水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マラソン粉剤 3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

とうがん

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)

にがうり

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

食用へちま

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)

うり類（漬物用）

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

ズッキーニ

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)

まくわうり

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	3,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
エルサン乳剤	P A P 乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	4回以内	4回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	3,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	2回以内	2回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

しろうり

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
エルサン乳剤	P A P 乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

【ナス科野菜】

トマト

農薬の名称（屋号抜き）	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
テルスターフロアブル	ピフェントリン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
マラソン乳剤	マラソン乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)

ミニトマト

農薬の名称 (屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクトラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (粒剤の処理は1回以内、散布は2回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
テルスターフロアブル	ピフェントリン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)

ピーマン

農薬の名称 (屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクトラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
マラソン乳剤	マラソン乳剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫前日まで	散布	5回以内	5回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回以内)

ピーマン (施設栽培)

農薬の名称 (屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)

とうがらし類

農薬の名称 (屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

とうがらし類 (ししとうを除く)

農薬の名称 (屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクトラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	3,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)

とうがらし類 (甘長とうがらしを除く)

農薬の名称 (屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内

ししとう

農薬の名称 (屋号抜き)	農薬の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクトラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	3,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	4回以内 (定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)

【その他】

パッションフルーツ

農業の名称（屋号抜き）	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	散布	2回以内	2回以内

スモモ

農業の名称（屋号抜き）	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	2回以内
アグロスリン水和剤	シベルメトリン水和剤	1,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
オリオン水和剤40	アラニカルブ水和剤	1,000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スカウトフロアブル	トラロメトリン水和剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内
テルスターフロアブル	ビフェントリン水和剤	3,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	2回以内
ハチハチフロアブル	トルフェンピラド水和剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	散布	2回以内	2回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

パパイヤ

農業の名称（屋号抜き）	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内

ビタヤ

(※通称：ドラゴンフルーツ)

農業の名称（屋号抜き）	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド水和剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	2回以内

グアバ (果実)

農業の名称（屋号抜き）	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム水溶剤	2,000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	散布	2回以内	2回以内

さやいんげん

農業の名称（屋号抜き）	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)
エルサン乳剤	P A P 乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	1回	1回
コルト顆粒水和剤	ピリフルキナゾン水和剤	4,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)
マラソン粉剤3	マラソン粉剤	3kg/10a	—	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内
モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	3回以内	3回以内

豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)

農業の名称（屋号抜き）	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
ダントツ水溶剤	クロチアニジン水溶剤	2,000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	散布	3回以内	3回以内

豆類(未成熟)

農業の名称（屋号抜き）	農業の種類	希釈倍率	散布量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	総使用回数
マラソン乳剤	マラソン乳剤	1,000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	3回以内	3回以内